

疫苗信息声明

Td(破伤风、白喉)疫苗： 须知事宜

1. 为何接种疫苗？

Td 疫苗可以预防破伤风和白喉。

破伤风可通过割伤或创伤进入体内。白喉会在人与人之间传播。

- **破伤风 (TETANUS, T)** 会引起肌肉疼痛性紧缩。破伤风可导致严重的健康问题，包括无法张口、吞咽和呼吸困难或死亡。
- **白喉 (DIPHTHERIA, D)** 可导致呼吸困难、心力衰竭、瘫痪或死亡。

2. Td 疫苗

Td 仅适用于 7 岁及以上的儿童、青少年和成人。

Td 通常作为一种**加强免疫，每 10 年**，或在严重或肮脏的伤口或烧伤的情况下 5 年之后进行接种。

另一种名为“Tdap”的疫苗可以用来代替 Td。除破伤风和白喉外，Tdap 还可预防百日咳，也称为“百日咳”。

Td 疫苗可以和其他疫苗一起接种。

Many vaccine information statements are available in Simplified Chinese and other languages. See www.immunize.org/vis

许多疫苗信息声明均提供简体中文和其他语言的版本。请参阅 www.immunize.org/vis

3. 请询问您的医务人员

如果准备接种疫苗者有以下情况，请告诉您的疫苗接种服务提供者：

- **先前接种过任何预防破伤风或白喉的疫苗后出现过敏反应，或有任何严重的、危及生命的过敏**
- 曾患有**格林-巴利综合征**(也称作 Guillain-Barré Syndrome, GBS)
- 之前接种过**任何预防破伤风或白喉的疫苗后曾出现过严重的疼痛或肿胀**

在某些情况下，您的医务人员可能会决定将 Td 疫苗接种推迟至下次就诊。

患有诸如感冒等轻微疾病的人可以接种疫苗。但对于患有中度或重度疾病的人，应当等康复后再接种 Td 疫苗。

您的医务人员可向您提供更多信息。



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

4. 疫苗反应的风险

- 在接种 Td 疫苗后, 有时会出现注射部位疼痛、发红或肿胀、轻度发热、头痛、感觉疲倦、恶心、呕吐、腹泻或胃痛。

人们有时在接受了医疗操作程序(包括接种疫苗)之后会昏厥。如果您感到头晕或视力发生变化或出现耳鸣, 请告诉您的医务人员。

和使用任何药物一样, 接种疫苗有可能造成严重的过敏反应、其它严重损伤或死亡, 但是可能性极小。

5. 如果出现严重问题怎么办?

过敏反应可能会发生在接种疫苗的人离开诊所后。如果您看到严重过敏反应的体征(荨麻疹、面部和喉咙肿胀、呼吸困难、心跳加快、头晕或无力), 请打电话给 9-1-1, 并把人送到最近的医院。

如出现其它让您担心的体征, 请打电话给您的医务人员。

应将不良反应报告给 Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, 疫苗不良事件报告系统)。您的医务人员通常会提交这份报告, 或者您可以自己来提交。请访问 VAERS 网站 www.vaers.hhs.gov, 或拨打电话 1-800-822-7967。VAERS 仅用于报告反应, VAERS 工作人员并不给予医疗建议。

6. National Vaccine Injury Compensation Program (国家疫苗伤害赔偿计划)

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP, 国家疫苗伤害赔偿计划) 是一项联邦计划, 旨在对可能因接种特定疫苗而受到伤害的人进行赔偿。关于声称因疫苗接种而受伤或死亡的索赔有提交时限, 最长可能为两年。请访问 VICP 网站 www.hrsa.gov/vaccinecompensation, 或拨打电话 1-800-338-2382, 以了解关于该计划的内容, 以及关于提出索赔的内容。

7. 我如何获得更多的信息?

- 请询问您的医务人员。
- 致电您当地或州健康部门。
- 请访问 Food and Drug Administration (FDA, 美国食品药品监督管理局) 网站, 获取疫苗药品说明书和其他信息, 网址为 www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines。
- 联系 Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 美国疾病控制与预防中心):
 - 致电 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 或
 - 访问 CDC 网站: www.cdc.gov/vaccines。

