

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង

# វ៉ាក់សាំងវារីសេឡា (ជំងឺអុតស្វាយ)៖ តើលោកអ្នកត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ

Many Vaccine Information Statements are available in Khmer and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

សេចក្តីផ្តើមការណែនាំនៃព័ត៌មានអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាច្រើនគឺអាចរកបានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាផ្សេងទៀត។ ចូលមើល [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

## 1. ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង?

វ៉ាក់សាំងវារីសេឡា (Varicella) អាចបង្ការ ជំងឺអុតស្វាយ។

ជំងឺអុតស្វាយ បណ្តាលឱ្យមានកន្ទួលរមាស់រយៈពេលប្រហែលមួយសប្តាហ៍។ ជំងឺនេះអាចបណ្តាលឱ្យក្មេងខ្លួនអស់កម្លាំង បាត់បង់ចំណង់ អាហារ និងឈឺក្បាល។ ជំងឺអុតស្វាយអាចនាំឱ្យមានការឆ្លងមេរោគលើស្បែក ឆ្លងមេរោគសួត រលាកសរសៃឈាម ហើមខួរក្បាល និង/ឬខួរក្តី ឯខ្លះៗ និងការឆ្លងមេរោគចូលឈាម ឆ្លង ឬសន្លាក់។ អ្នកខ្លះមានជំងឺអុតស្វាយមានកេតកន្ទួល ឈឺចាប់ដែលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកគេហៅថា “ជំងឺរឹម” (ស្គាល់ថាជារឹមសរសៃ)។

ជំងឺអុតស្វាយជាទូទៅមានកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែវាអាចធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទារកដែលមានអាយុក្រោម 12 ខែ ក្មេងជំទង់ មនុស្សពេញវ័យ អ្នកមានផ្ទៃពោះ និងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពសុំចុះខ្សោយ។ មនុស្សមួយចំនួនឈឺដែលត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។ វាមិនកើតឡើងញឹកញាប់ទេ ប៉ុន្តែមនុស្សអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺអុតស្វាយបាន។

មនុស្សភាគច្រើនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងវារីសេឡា 2 ដូស នឹងត្រូវបានការពារអស់មួយជីវិត។

## 2. វ៉ាក់សាំងវារីសេឡា

- កុមារ ត្រូវការវ៉ាក់សាំងវារីសេឡា 2 ដូស ជាធម្មតា៖
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំបូង នៅអាយុ 12 ទៅ 15 ខែ
  - ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទីពីរ នៅអាយុ 4 ឆ្នាំ ទៅ 6 ឆ្នាំ

កុមារដែលមានអាយុច្រើនជាងនេះ ក្មេងជំទង់ និងមនុស្សពេញវ័យ ក៏ត្រូវការវ៉ាក់សាំងវារីសេឡាចំនួន 2 ដូសផងដែរ ប្រសិនបើពួកគេមិនទាន់មានភាពសុខនឹងជំងឺអុតស្វាយ។

វ៉ាក់សាំងវារីសេឡាអាចចាក់ឱ្យក្មេងពេលដំណាលគ្នា នឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដទៃទៀត។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ក្មេងអាយុចន្លោះពី 12 ខែដល់ 12 ឆ្នាំអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងវារីសេឡា រួមគ្នាជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំង MMR (កញ្ជីល ស្រឡាទេន និងស្តូច) ក្នុងការចាក់តែម្តង ឬហៅថា

MMRV។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នកបាន។

## 3. និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀត។

ប្រាប់អ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ប្រសិនបើ បុគ្គលនោះទទួលវ៉ាក់សាំង៖

- មាន ប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ី បន្ទាប់ពី ការ ទទួល វ៉ាក់សាំងវារីសេឡាមុនៗ ឬមាន អាឡែហ្ស៊ី ធ្ងន់ធ្ងរ គំរាមកំហែងដល់ជីវិត
- ស្ត្រី មានផ្ទៃពោះ ឬ គិតថាពួកគេអាចនឹងមាន ផ្ទៃពោះ —ស្ត្រី មានផ្ទៃពោះមិនគួរទទួលវ៉ាក់សាំងវារីសេឡានោះទេ
- មាន ប្រព័ន្ធភាពសុំចុះខ្សោយ ឬមាន ឪពុកមាយ បងប្អូនប្រុស ឬស្រី ដែលមានប្រវត្តិ ទាក់ទងនឹង បញ្ហាប្រព័ន្ធភាពសុំចុះខ្សោយ កំណើត ឬ តំណពូជ
- កំពុងតែប្រើ Salicylates (ដូចជាថ្នាំអាស៊ីរីន)
- ថ្មីៗនេះមានការបញ្ចូលឈាម ឬទទួលបានផលិតផលឈាមដទៃទៀត
- មានជំងឺ របេង
- ទទួលវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល 4 សប្តាហ៍

ក្នុងករណី ខ្លះ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចសម្រេច ចិត្តពន្យារពេលការចាក់វ៉ាក់សាំងវារីសេឡារហូតដល់ការណាត់ ជួបនាពេលខាងមុខ។

អ្នកដែលមានជំងឺស្រាល ដូចជាជំងឺផ្តាសាយ អាចទទួលថ្នាំបង្ការនេះបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺ ធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្ងន់ធ្ងរ គួររង់ចាំ រហូតដល់ពួកគេជាសះស្បើយស្រស់ នៃ មុនពេលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងវារីសេឡា។

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នកបាន។



U.S. Department of Health and Human Services  
Centers for Disease Control and Prevention

#### 4. ហានិភ័យកើតប្រតិកម្មថ្នាំវ៉ាក់សាំង

- អាការៈឈឺដៃដោយសារការចាក់ ឡើង ឬក្រហម ឬក្នុងនូវ នៅកន្លែង ចាក់ថ្នាំ ឬគ្រុនក្តៅអាចកើតឡើង ឯបន្ទាប់ពី ចាក់វ៉ាក់សាំង រ៉ាំរ៉ៃសេឡា។
- ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះកើតឡើង ឯកម្រណាស់។ ទាំងនេះអាចរួមមានជំងឺ រលាកសួត ការឆ្លងមេរោគនៃ ខួរក្បាល និង/ឬការគ្របខ្លួនឆ្អឹង ឬការប្រកាច់ដែល ច្រើនតែបណ្តាល មកពី គ្រុនក្តៅ។
- ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ ការពាររាងកាយ វ៉ាក់សាំងនេះអាចបណ្តាល ឱ្យឆ្លងដែល អាចគំរាមកំហែងដល់ អាយុជីវិត។ អ្នកដែលមានបញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ មិនគួរទទួល ថ្នាំបង្ការជំងឺ រ៉ាំរ៉ៃសេឡាទេ។

អ្នកដែលទទួលថ្នាំបង្ការអាចកើត តកន្តលរមាស់។ ប្រសិនបើ ករណី នេះកើតឡើង មេរោគវ៉ាក់សាំងរ៉ាំរ៉ៃ សេឡា អាចឆ្លងទៅមនុស្សដែលគ្មានការការពារ។ អ្នកដែល កើតតកន្តលនៅឆ្ងាយពី អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស្មុំ ចុះខ្សោយ និងទារកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងរហូត ទាល់តែបាត់តកន្តល។ និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ សុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀត។

មនុស្សមួយចំនួនដែលទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺ អុតស្វាយ អាច កើតជំងឺ វេរីម (herpes zoster) ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមក។ នេះ គឺជាបញ្ហាម្រុកកើតមានក្រោយពេលចាក់ថ្នាំបង្ការជាង ក្រោយកើតជំងឺ អុតស្វាយ។

ពេលខ្លះ មនុស្សស្លាប់ បន្ទាប់ពី ដំណើរការវេជ្ជសាស្ត្ររួម ទាំងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ សូមប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ សុខភាពរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកវិលមុខ ឬ ចក្ខុញ្ញាណផ្លាស់ប្តូរ ឬឮសំឡេងហ្នឹង ឯក្នុងត្រចៀក។

ដូចថ្នាំផ្សេងទៀតដែរ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកម្រនឹងបង្កប្រតិ កម្មអាណែហ្ស៊ី ធ្ងន់ធ្ងរ ឬសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេង ឬធ្វើឱ្យស្លាប់ បាត់បង់ជីវិតណាស់។

#### 5. ចុះបើមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ?

ប្រតិកម្មអាណែហ្ស៊ី អាចកើតឡើង ឯបន្ទាប់ពី អ្នកទទួលថ្នាំ បង្ការចាក់ចេញពី គ្រឹះនិក។ ប្រសិនបើ អ្នកឃើញសញ្ញានៃ ប្រតិកម្មអាណែហ្ស៊ី ធ្ងន់ធ្ងរ (កន្តលកហម ហើមមុខ និង បំពង់ក ពី បាក់ដកដង្ហើម បេះដូងលោតញាប់ វិលមុខ ឬ ខ្សោយ) សូមទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ហើយនាំអ្នក ជំងឺ ទៅ មន្ទីរពេទ្យ ដែលនៅជិតបំផុត។

សម្រាប់សញ្ញាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យអ្នកបារម្ភ សូម ទូរស័ព្ទទៅ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

Khmer translation provided by Immunize.org

ប្រតិកម្មទៅប្រព័ន្ធភាពការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង គួរតែត្រូវបានរាយការណ៍ ទៅ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ សុខភាពរបស់អ្នកជាធម្មតា នឹងដាក់របាយការណ៍ នេះ ឬអ្នកអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបាន។ សូមចូលទៅ គេហទំព័រ ប្រព័ន្ធភាពការណ៍ ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VAERS) [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-822-7967។ ប្រព័ន្ធភាពការណ៍ ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) សម្រាប់តែការរាយការណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ បុគ្គលិក របស់ប្រព័ន្ធភាពការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) មិន ផ្តល់ជំនួយនូវអំពី វេជ្ជសាស្ត្រទេ។

#### 6. កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំ វ៉ាក់សាំង

National Vaccine Injury Compensation Program (កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VICP)) គឺជាកម្មវិធី របស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ដែលបានបង្កើត ឡើងដើម្បីបង់សងអ្នកទាំងឡាយដែលអាចរងរបួស ដោយសារតែថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយចំនួន។ ការទាមទារទាក់ទង នឹងរបួស ឬការស្លាប់ដោយសារការ ទទួលថ្នាំ បង្ការ មាន ពេលវេលាណាត់សម្រាប់ការដាក់ឯកសារ ដែលអាចមាន រយៈពេលខ្លី ត្រឹមពីរ ឆ្នាំ។ សូមចូលទៅគេហទំព័រកម្មវិធី ជាតិ បង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VICP) [www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation) ឬទូរស័ព្ទទៅ លេខ 1-800-338-2382 ដើម្បីសិក្សាអំពី កម្មវិធី នេះ ឯការ ដាក់ពាក្យទាមទារ។

#### 7. តើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយរបៀប ណា?

- សូមសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក។
- សូមទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋាន របស់លោកអ្នក។
- សូមចូលទៅ Food and Drug Administration (គេហទំព័រ រដ្ឋបាលអាហារនិងឱសថ (FDA)) ដើម្បី ទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មថ្នាំបង្ការ និងព័ត៌មាន បន្ថែម [www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines](http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines)។
- Centers for Disease Control and Prevention (ស្ថាប័ន ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺ (CDC))៖
  - សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
  - ចូលមើលគេហទំព័រ របស់ CDC នៅ [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines)។