

# Bebekler için Aşılama

Ebeveynler için Kılavuz

Bunlar bebeğiniz için gereken aşılar!

Doğumda	HepB
2 aylıkken	HepB <sup>1</sup> + DTaP + KPA + Hib + Çocuk felci + RV
4 aylıkken	HepB <sup>2</sup> + DTaP + KPA + Hib + Çocuk felci + RV
6 aylıkken	HepB <sup>3</sup> + DTaP + KPA + Hib <sup>3</sup> + Çocuk felci + RV <sup>4</sup> + Influenza <sup>5</sup> + COVID <sup>6</sup>
12 aylık ve daha büyük	KKK + DTaP + KPA + Hib + Suçiçeği + HepA <sup>7</sup> + Influenza <sup>5</sup>

Bebeğinizin tüm aşıları zamanında yapıldığından emin olmak için doktorunuza veya hemşirenize danışınız. Aşılar iğne sayısını azaltmak için genellikle birleştirilirler. Bebeğinize yapılan aşuların tarihlerini gösteren kayıt kartını mutlaka isteyiniz ve bu kartı her ziyaretinizde yanınızda getiriniz.

İşte bebeğinizin korunacağı hastalıkların listesi:

**HepB:** ciddi bir karaciğer hastalığı olan hepatit B

**DTaP:** difteri, tetanos (kazıklı humma) ve pertusis (boğmaca)

**KPA:** Konjuge pnömokok aşısı ciddi bir kan, akciğer ve beyin enfeksiyonuna karşı korur

**Hib:** ciddi bir beyin, boğaz ve kan enfeksiyonu olan *Haemophilus influenzae* tip b

**Çocuk felci:** ciddi, felç edici bir hastalık olan çocuk felci

**RV:** ciddi bir ishal hastalığı olan rotavirüs enfeksiyonu

**Influenza:** ciddi bir akciğer enfeksiyonu

**KKK:** kızamık, kabakulak ve kızamıkçık

**COVID-19:** ciddi ve oldukça bulaşıcı bir hastalık

**HepA:** ciddi bir karaciğer hastalığı olan hepatit A

**Suçiçeği:** Varisella da denir

#### Yukarıdaki çizelge için notlar:

1. Bu aşının yapılması gereken yaş aralığıdır.
2. Kullanılan aşıya bağlı olarak, bebeğinize 4 aylıkken bir doz Hep B aşısı gerekmeyebilir. Doktorunuza veya hemşirenize danışınız.
3. Kullanılan aşıya bağlı olarak, bebeğinize 6 aylıkken bir doz Hib aşısı gerekmeyebilir. Doktorunuza veya hemşirenize danışınız.
4. Kullanılan aşıya bağlı olarak, bebeğinize 6 aylıkken bir doz RV aşısı gerekmeyebilir. Doktorunuza veya hemşirenize danışınız.
5. 6 aylık ve daha büyük tüm çocuklar her yılın sonbaharında veya kışında influenzaya karşı aşılanmalıdır.
6. Çocuğunuza yapılan COVID-19 aşısının markasına bağlı olarak 2 veya 3 doz gerekecektir.
7. Çocuğunuza en az 6 ay arayla 2 doz HepA aşısı gerekecektir.

"Immunizations for Babies"

Turkish translation provided by Betül Polatdemir, MD, Ankara, Turkey,  
and Nur Polatdemir Çevik, Near East University, Nicosia, Cyprus

