

成人疫苗接种

您永远不会因为年龄太大而不能接种疫苗！

进行免疫接种是一项终身持续、保护生命的事情。在没有确认您已经接种了您所需的所有疫苗之前，请不要离开您的医务人员的诊室。

疫苗	您需要接种吗？
新冠肺炎 (COVID-19)	是的！ 建议所有成年人在符合条件的情况下接受新冠病毒疫苗基础免疫 + 加强免疫。
甲肝 (HepA)	也许。 如果您具有甲型肝炎病毒感染*的特定危险因素，或只是想预防这种疾病，那么您需要接种这种疫苗。该疫苗通常要注射 2 剂，两剂相隔 6-18 个月。
乙肝 (HepB)	是的！ 建议所有年满 60 岁的成年人根据品牌完成 2 剂或 3 剂乙肝疫苗接种系列。如果您年满 60 岁并且有特定危险因素，或者您没有危险因素但只是想接种疫苗，您也需要接种该疫苗。
Hib (乙型流感嗜血杆菌)	也许。 比如，一些患有特定高风险病症* (例如，脾脏功能不全) 的成年人需要接种 Hib。与您的医务人员交谈，弄清楚您是否需要接种该疫苗。
人乳头瘤病毒 (HPV)	是的！ 如果您年龄在 26 岁或以下，您应该接种该疫苗。27-45 岁的成人也可在与医务人员讨论后接种 HPV 疫苗。该疫苗需注射 2 剂或 3 剂 (这取决于接种第 1 剂时的年龄)，在 6 个月期间完成注射。
流感病毒 (流感)	是的！ 您需要在每年秋天 (或甚至迟至冬天或春天) 接种流感病毒疫苗，以保护自己和保护您周围的其他人。
麻疹、腮腺炎、风疹 (MMR)	也许。 如果您出生于 1957 年或之后，您需要注射至少 1 剂 MMR。您可能还需要接种第二剂。* 免疫系统减弱的人不应接种 MMR 疫苗。*
脑膜炎球菌 ACWY (MenACWY)	也许。 如果您患有某几种健康病症之一，您可能需要接种 MenACWY 疫苗，*例如，如果您有脾功能不全，并且您的风险正在持续，您还需要加强免疫。如果您年龄没有超过 21 岁，并且是集体住宿的大学新生，而且您从没有接种过该疫苗，或只在 16 岁之前接种过该疫苗，那么您需要接种 MenACWY。
脑膜炎球菌 B (MenB)	也许。 如果您患有某几种健康病症之一，您可能需要接种 MenB，*例如，如果您有脾功能不全，并且您的风险正在持续，您还需要加强免疫。如果您年龄在 23 岁或以下 (即使您没有患高风险疾病)，在与您的医务人员讨论后，您也可以考虑接种 MenB 疫苗。
肺炎球菌 (PPSV23; PCV15、PCV20)	是的！ 患有某些基础性疾病 (例如慢性心脏病) 或具有其他健康危险因素 65 岁以下成人需要接种肺炎球菌疫苗。所有 65 岁及以上的成人如果之前未接种过肺炎球菌结合疫苗(PCV)，也需要接种疫苗。您的医务人员可以确定您可能需要哪种疫苗 (如果有)。
破伤风、白喉、百日咳 (Tdap、Td)	是的！ 以前从没有接受过 Tdap 疫苗的成人现在需要注射 Tdap 疫苗。此后，您需要每 10 年注射一剂 Tdap 或 Td 加强免疫疫苗。如果您以前尚没有注射过至少 3 剂含破伤风和白喉类毒素疫苗的药物，或您曾经有深度或受污染的伤口，请咨询您的医务人员。
水痘	也许。 如果您从未得过水痘，也从未接种过该疫苗，或者只接种过 1 剂疫苗，请咨询您的医务人员，以确定您是否需要接种该疫苗。
带状疱疹	是的！ 如果您年满 19 岁且免疫系统较弱，或者年满 50 岁，您应该接种 Shingrix 带状疱疹疫苗的 2 剂系列，即使您已经接种了 Zostavax。

* 请咨询您的医务人员，以确定您的感染风险水平以及您是否需要该疫苗。

您打算到美国以外的地方旅行吗？请访问美国疾病控制与预防中心 (CDC) 网站 wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list，获取旅行信息，或者咨询旅行诊所。

