

د واکسينو د معلوماتو بيانیه

Many Vaccine Information Statements are available in Pashto and other languages. See www.immunize.org/vis

د واکسين معلوماتو ډېرې بيانې په پښتو او نورو ژبو موجود دي. وگورئ www.immunize.org/vis

د کووید 19 واکسين:

هغه څه چې تاسو يې په اړه بايد پوه شئ

1. ولې بايد واکسين وکړو؟

د کووید 19 واکسين کولی شي د کووید 19 ناروغۍ مخه ونيسي. که چېرې تاسې ناروغه شئ واکسين کولی شي د کووید 19 ناروغۍ شدت کې کموالی راوړي.

کووید 19 د SARS-CoV-2 په نوم يادېدونکي کورونا وېروس په واسطه پيدا کېږي چې له يوه فرد څخه بل ته په اسانۍ تېرېږي. کووید 19 د خفيف څخه تر متوسط ناروغۍ لامل کېدلی شي چې يوازې يو څو ورځې دوام کوي، يا هم شديد ناروغۍ چې روغتون کې بستر کېدو، ډېرې پاملرنې ته اړتيا لري يا هم د ساه اخيستلو کې د مرستې لپاره وينټيلېټر ته. کووید 19 د مړينې لامل هم کېدلی شي. که چېرې پدې اخته شوی فرد علاوه ولري، دا د وېروس سره مخ کېدو څخه 2 تر 14 ورځو پورې وروسته رانښکاره کېږي. هرڅوک کولی شي له خفيف تر شديد علاوه ولري.

• په ممکن علاوه کې تبه يا ساره، ټوخی، ساه لنډی يا ساه اخستلو کې مشکل، ستړيا (ستوماني)، د عضلو يا د بدن دردونه، سر درد، د خوند يا بوی حس له لاسه ورکول، د ستوني درد، د پزې بنديدل يا بهيدل، زړه بدی يا گرځون، يا نس ناستی شامل دي.

• په خورا جدي علاوه کې دا موارد شامل کېدلی شي: ساه اخيستلو کې مشکل، په سينه کې دوام لرونکی درد يا فشار، نوې پرېشاني، د راوينيدو يا وېش پاتې کېدو وړتيا نه درلودل، د پوټکي، شونډو، يا د نوکانو لاندې رنگ الوتل، خړيدل يا شنه کيدل، د پوټکي څرنګوالي په پام کې نيولو سره.

د ډير عمر لرونکی او د ځينې طبي ناروغيو (لکه د زړه يا د سږو ناروغي يا شکر) لرونکی خلکو د کووید 19 له امله د شديد ناروغيو احتمال ډير دی.

2. د کووید 19 واکسين

د کووید 19 اپډيټ شوي (د 2023-2024 فورمول) واکسين د 6 مياشتو او لدې څخه پورته عمر لرونکو ټولو لپاره سپارښتنه کېږي.

د 6 مياشتو څخه تر 11 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومانو لپاره د کووید 19 واکسين د امريکا متحده ايالاتو د خوړو او درملو ادارې (Food and Drug Administration, FDA) لخوا د بېرني استعمال جواز لاندې موجود دي. مهرباني وکړئ د نورو معلوماتو لپاره د ترلاسه کونکو او پاملرنه کونکو لپاره معلومات پانې وگورئ.



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

د 12 کلونو او لدې پورته عمر لرونکو افرادو لپاره د کووید 19 اپډيټ شوي واکسين چې د ModernaTX, Inc. (موډرنا) يا Pfizer, Inc. (فايزر) په واسطه توليد شوي دي، د FDA لخوا تاييد شوي دي.

• د 12 کلونو او لدې ډير عمر لرونکی هرڅوک بايد د FDA لخوا تاييد شوي د کووید 19 د 2023-2024 اپډيټ واکسين 1 دوز وکړي. که تاسې پدې وروستيو کې د کووید 19 واکسين کړي وي، تاسې بايد د کووید 19 د 2023-2024 اپډيټ واکسين ترلاسه کولو لپاره د خپل ترټولو وروستي دوز څخه لږترلږه 8 اونۍ انتظار وکړئ.

• ځينې خلک چې طبي ناروغۍ لري يا داسې درمل خوري چې د هغوی معافيت باندې اغيزه کوي هغوی کولی شي د کووید 19 واکسين اضافي دوز ترلاسه کړي. ستاسې روغتياپال کولی شي تاسې ته مشوره درکړي.

ځينې 12 کلن يا ډير عمر لرونکی افراد شايد د کووید 19 مختلف واکسين وکړي چې د نوواکس کووید 19 واکسين په نوم يادېږي، د (2023-2024 فورمول) پرځای کومکي. دا واکسين د FDA لخوا د بېرني استعمال جواز لاندې موجود دي. مهرباني وکړئ د نورو معلوماتو لپاره د ترلاسه کونکو او پاملرنه کونکو لپاره معلومات پانې وگورئ.

3. له خپل روغتياپال سره خبرې وکړئ

د واکسينو چمتو کوونکي ته خبر ورکړئ که چېرې واکسين کيدونکی شخص:

• د کووید 19 واکسين د مخکيني دوز وروسته يا د کووید 19 واکسين کې موجود کومو اجزاو ته يې حساسيتي غبرګون درلود، يا هم کوم شديد، د ژوند ګواښوونکی حساسيت يې درلودلی وي

• که ميوکارډيټيز (د زړه د عضلو پرسوب) يا پيريکارډيټيز (د زړه د باندینۍ پردې پرسوب) يې درلودلي وي

• د څو سيستم التهاني سينډروم يې درلودلی وي (په ماشومانو کې MIS-C او په لويانو کې MIS-A بلل کېږي)

• د بدن دفاعي سيستم يې کمزوری وي

په ځينو مواردو کې، ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکی ښايي پريکړه وکړي چې د کووید 19 واکسين تر راتلونکي ليدنې پورې وځنډوي.

د زکام په څېر د کوچنيو ناروغيو لرونکي خلک هم کولی شي واکسين ترسره کړي. هغه کسان چې په منځني ډول يا سخت ناروغه وي زياتره تر رغيدو پورې انتظار بايد باسي. هغه خلک چې اوس په کووید 19 عفونيت اخته وي بايد د ناروغۍ څخه رغيدو او د جلا والي ختمولو پورې واکسين ته انتظار وکړي.

کوویډ 19 باندې اخته بلارې میرمنې د شدید ناروغۍ لوړ خطر سره مخ دي. هغه میرمنو لپاره د کوویډ 19 واکسینو سپارښتنه کېږي چې بلارې وي، د تې شیدې ورکوي، یا اوس وخت کې هڅه کوي بلارې شي، یا شاید په راتلونکي کې وغواړي چې بلارې شي.

د کوویډ 19 واکسین ښایي د نورو واکسینونو سره په ورته وخت کې ورکړل شي.

4. د واکسین پر وړاندې د غبرگون خطرونه

- د ستنې تزریق ځای کې درد، پړسوب، یا سور والی، تبه، ستریا، سر درد، ساره، د عضلو درد، د جوړونو درد، زړه بدی، گرځون، او د لنفاوي غدو پړسوب د کوویډ 19 واکسین وروسته پېښېدلی شي.
- میوکارډیټیز (د زړه د عضلو پړسوب) یا پیریکارډیټیز (د زړه د باندینۍ پردې پړسوب) د کوویډ 19 واکسین وروسته په ندرت سره لیدل شوي دي. دا خطر ډیر د 12 څخه تر 39 کلونو پورې عمر لرونکي نارینه و کې لیدل شوی دی. د دې د پېښېدو چانس ډیر ټیټ دی.
- خلک ځینې وختونه د واکسینو په ګډون له ځینو روغتیايي کړنلارو وروسته بې هوښه کېږي. که په تاسو سرګرځېږي، یا مو په لیدو کې بدلون راغلی وي یا مو په غوږ کې زنگاری وي، په اړه یې خپل روغتیایال ته وواياست.

لکه د نورو درملو په څېر، واکسین هم په ډېر نادره توګه له سخت حساسیت، نورو جدي ټپونو، یا مړینې سبب ګرځېدای شي.

5. څه به کېږي که چیرې کومه جدي ستونزه شتون ولري؟

یو حساسیتي غبرګون کېدای شي هغه مهال رامنځته شي چې کله واکسین شوی کس له کلینیک څخه ووځي. که تاسو د جدي غبرګون نښې لکه (ټپونه، د مخ او ستوني پړسوب، تنفسي ستونزې، د زړه چټک ضربان، ستریا، یا کمزوري) ولیدلې نو، 1-1-9 شمېرې ته زنگ ووهئ او اړونده شخص تر ټولو نږدې روغتون ته ویسئ.

سمدلاسه طبي پاملرنه ولټوئ که چیرې فرد د کوویډ 19 واکسین وروسته د سینې درد، ساه لنډی، یا د ساه تیزیدو احساس، بې واکه کیدل، یا د زړه درزا تجربه کړي. دا د میوکارډیټیز یا پیریکارډیټیز علایم کیدی شي.

د نورو هغو علایمو لپاره چې تاسو یې په اړه اندېښنه لرئ، خپل د روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکي ته زنگ ووهئ.

د منفي غبرګونونو په اړه باید دواکسینو

ضرري پېښو د راپور سیستم

(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) د

ته راپور ورکړل شي. ستاسو روغتیایال زیاتره دا ډول راپورونه

ثبتي، یا تاسو خپله باید دا کار وکړئ. له VAERS وېب سایټ

څخه په دې پته لیدنه وکړئ www.vaers.hhs.gov یا دې شمیرې

ته زنگ ووهئ 1-800-822-7967. VAERS یواځې د غبرګون په

اړه د راپور ورکولو لپاره دی، او د VAERS کارکوونکي روغتیايي

مشورې نه ورکوي.

6. د متقابل عمل اړوند د زیانونو د جبران برنامه

د متقابل عمل اړوند د زیانونو د جبران برنامه (Countermeasures Injury Compensation Program, CICP)

یوه فدرالي برنامه ده چې کولی شي د روغتیايي پاملرنې د

لګښتونو او د ځینو ځانګړو کسانو د نورو ځانګړو لګښتونو په

تادیه کولو کې مرسته وکړي چې د ځانګړو درملو یا واکسینونو

له امله سخت ټپي شوي وي، پشمول د دې واکسین. عموماً،

CICP ته باید ادعا د واکسین کولو نېټې څخه په یوه (1) کال

موده کې وسپارل شي. د دې پروګرام په اړه د نورو معلوماتو

لپاره، د پروګرام وېب سایټ www.hrsa.gov/cicp ته ورشئ، یا

1-855-266-2427 ته زنگ ووهئ.

7. څرنگه کولی شم نور معلومات لاسته راوړم؟

• له خپل روغتیایال څخه پوښتنې وکړئ.

• خپلې ځایي یا ایالتي روغتیايي څانګې ته زنگ ووهئ.

• د کوویډ 19 معلومات پانډو، د کڅوړې معلوماتو، او

نورو اضافي معلوماتو لپاره د خوړو او درملو ادارې

(Food and Drug Administration, FDA) وېب پاڼې

[www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/industry-](http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/industry-biologics/coronavirus-covid-19-cber-regulated-biologics)

[biologics/coronavirus-covid-19-cber-regulated-biologics](http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/industry-biologics/coronavirus-covid-19-cber-regulated-biologics)

ته ورشئ.

• د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)

سره په اړیکه کې شئ:

- (1-800-CDC-INFO) (1-800-232-4636) ته زنگ ووهئ یا

- د CDC د کوویډ 19 وېب سایټ

www.cdc.gov/coronavirus ته په دې پته ورشئ.

