

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VACINA

Vacina contra *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib): O que você precisa saber

Many vaccine information statements are available in Portuguese and other languages. See www.immunize.org/vis

Muitas declarações de informações sobre vacinas estão disponíveis em português e outros idiomas. Consulte www.immunize.org/vis

1. Por que se vacinar?

A vacina contra Hib pode prevenir a doença *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib).

Haemophilus influenzae tipo b pode causar muitos tipos diferentes de infecções. Essas infecções geralmente afetam crianças menores de 5 anos de idade, mas também podem afetar adultos com certas condições médicas. As bactérias Hib podem causar doenças leves, como infecções dos ouvidos ou bronquite, ou podem causar doenças graves, como infecções do sangue. A infecção grave por Hib, também chamada de “doença invasiva por Hib”, requer tratamento em um hospital e às vezes pode resultar em morte.

Antes da vacina contra Hib, a doença de Hib era a principal causa de meningite bacteriana entre as crianças menores de 5 anos nos Estados Unidos. A meningite é uma infecção do revestimento do cérebro e da medula espinhal. Ela pode causar lesões cerebrais e surdez.

A infecção por Hib também pode causar:

- Pneumonia
- Forte inchaço na garganta, o que dificulta a respiração
- Infecções do sangue, das articulações, dos ossos e da cobertura do coração
- Morte

2. Vacina contra Hib

A vacina contra Hib normalmente é fornecida em 3 ou 4 doses (dependendo da marca).

Bebês geralmente recebem sua primeira dose de vacina contra Hib aos 2 meses de idade e normalmente completam a série aos 12-15 meses de idade.

Crianças entre 12 meses e 5 anos de idade que ainda não foram completamente vacinadas contra Hib podem precisar de 1 ou mais doses de vacina contra Hib.

Hib VIS - Portuguese (8/6/21)

Crianças com mais de 5 anos e adultos

geralmente não recebem a vacina Hib, mas pode ser recomendada para crianças mais velhas ou adultos cujo baço esteja danificado ou tenha sido removido, incluindo pessoas com doença falciforme, antes da cirurgia para remover o baço, ou após um transplante de medula óssea. A vacina contra Hib também pode ser recomendada para pessoas de 5 a 18 anos de idade com HIV.

A vacina contra Hib pode ser dada como uma vacina isolada ou como parte de uma vacina combinada (um tipo de vacina que combina mais de uma vacina em uma única injeção).

A vacina contra Hib pode ser administrada ao mesmo tempo que outras vacinas.

3. Converse com seu profissional de saúde

Diga ao seu profissional de saúde se a pessoa que receber a vacina:

- Teve uma **reação alérgica após uma dose anterior de vacina contra Hib** ou tem qualquer **alergia grave e com risco à vida**

Em alguns casos, seu provedor de saúde pode decidir adiar a vacinação contra Hib até uma visita futura.

Pessoas com doenças mais leves, como um resfriado, podem ser vacinadas. Pessoas com doenças moderadas ou graves normalmente devem aguardar até que se recuperem antes de receber a vacina contra Hib.

Seu profissional de saúde pode fornecer mais informações.



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

4. Riscos de uma reação à vacina

- Vermelhidão, calor e inchaço onde a vacina é administrada e febre podem ocorrer após a vacinação contra Hib.

As pessoas às vezes desmaiam após procedimentos médicos, incluindo vacinação. Avise o profissional de saúde se sentir tontura ou tiver alterações na visão ou zumbido nos ouvidos.

Assim como com qualquer medicamento, existe uma chance muito remota de uma vacina causar reação alérgica grave, outros ferimentos graves ou morte.

5. E se houver um problema grave?

Uma reação alérgica pode ocorrer após a pessoa vacinada sair da clínica. Se você perceber sinais de uma reação alérgica grave (urticária, inchaço do rosto e garganta, dificuldade para respirar, batimento cardíaco acelerado, tontura ou fraqueza), ligue para **9-1-1** e leve a pessoa ao hospital mais próximo.

Para outros sinais que o preocupam, ligue para seu profissional de saúde.

Reações adversas devem ser relatadas ao Sistema de Relatórios de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS). Seu profissional de saúde normalmente preencherá este relatório ou você mesmo pode fazê-lo. Visite o site do VAERS em www.vaers.hhs.gov ou ligue para **1-800-822-7967**. *O VAERS serve apenas para relatar reações, e membros da equipe VAERS não fornecem orientações médicas.*

6. O Programa Nacional de Compensação por Lesões por Vacinas

O Programa Nacional de Compensação por Lesões por Vacinas (VICP) é um programa federal que foi criado para compensar pessoas que podem ter sido lesionadas por certas vacinas. Alegações de supostas lesões ou morte devido à vacinação têm um limite de tempo para serem encaminhadas, o que pode ser no máximo dois anos. Visite o site do VICP em www.hrsa.gov/vaccinecompensation ou ligue para **1-800-338-2382** para saber mais sobre o programa e como encaminhar uma alegação.

7. Como posso saber mais?

- Pergunte ao seu profissional de saúde.
- Ligue para o seu departamento de saúde local ou estadual.
- Visite o site da Food and Drug Administration (FDA) para as bulas das vacinas e mais informações em www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.
- Entre em contato com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC):
 - Ligue para **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** ou
 - Visite o site do CDC em www.cdc.gov/vaccines.

