

רעספּיראַטאָרי סינקיטיאַל ווירוס וואַקצין (RSV) פרעווענטיווע אַנטיקערפּער: וואָס איר דאַרפֿט וויסן

פֿאַרוואָס צו ווערן אימוניזירט מיט אַ RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער?

אַ רעספּיראַטאָרי סינקיטיאַל ווירוס (Respiratory Syncytial Virus, RSV) פרעווענטיווע אַנטיקערפּער קען אָפהאַלטן שווער לונג קראַנקייט פֿאַרשאַפֿן ביי RSV.

RSV איז אַ געוויינטלעך רעספּיראַטאָרי ווירוס וואָס אין אַלגעמיין פֿאַרשאַפֿט מילד סימפּטאָמס אַזוי ווי פֿאַרקילונג אָבער קען אויך ווירקן אויף די לונגען. סימפּטאָמס פֿון RSV אינפֿעקציע מעגן אַרמינעמען רינען נאָז, פֿאַרקלערן אָפעטיט, הוסטן, ניסן, פֿיבער אָדער באַרכלען.

אַלע קענען אינפֿעקטירט ווערן ביי RSV, און כמעט אַלע קינדער קריגן אַ RSV אינפֿעקציע ביי דעם צייט זיי זינען 2 יאָר אַלט. דערווייל מעסערט קינדער קומען אויף זיך פֿון אַ RSV אינפֿעקציע אין אַ וואָך אָדער צוויי, RSV אינפֿעקציע קען זיין געפֿערלעך פֿאַר זייגקינדער און עטלעכע יונגע קינדער, פֿאַרשאַפֿן שוועריקייט צו אָטעמען, נידעריק זויערשטאָף ניוואָן און דיכידריישאָן. אין די פֿאַראייניקטע שטאַטן, RSV איז די מערסט געוויינטלעך סיבה אויף בראַנטשיאַליטיס (אַנצינדונג פֿון די קליינע לופֿט וועג אין לונג) און פּנעומואַניאַ (אינפֿעקציע פֿון די לונגען) איז קינדער יונגער ווי 1 יאָר אַלט. קינדער וואָס ווערן קראַנק מיט RSV מעגן דאַרפֿן גיין אין שפיטאַל, און עטלעכע מעגן אָפֿילו שטאַרבן.

RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער

דעם RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער (דזשאַנעריק נאָמען Nirsevimab, האַנדלען נאָמען Beyfortus) איז אַ וואַקצינירונג וואָס פֿאַרשטערט שווער RSV קראַנקייט אין זייגקינדער און יונגע קינדער. אַנטיקערפּער זינען פֿראַקטען וואָס דעם אימונע סיסטעם פֿון קערפּער ניצט צו קעמפֿן קעגן שאַדנדיקע גערמעס. אַזוי ווי טראַדיציאָנעל וואַקצינען, פרעווענטיווע אַנטיקערפּער זינען אימוניזאַטיאָנס וואָס צושטעלן באַשיצונג קעגן אַ ספּעציפֿיש פֿאַטהאַגען. דערווייל ביידע זינען אימוניזאַטיאָנס, דעם וועג אין וועלכן זיי צושטעלן אימוניטעט איז פֿאַרשיידן. Nirsevimab איז אַן אימוניזאַציע וואָס צושטעלט אַנטיקערפּער דירעקט צום באַקומער. טראַדיציאָנעלע וואַקצינען זינען אימוניזאַטיאָנס וואָס סטימולירן דעם אימונע סיסטעם פֿון דעם באַקומער כדי צו פֿראַדוצירן אַנטיקערפּער.

זייגקינדער געבוירן געוואָרן במשך דעם RSV צייט (געוויינלעך האַרבסט דורך פֿרילינג) דאַרפֿן באַקומען אַן איינציקע דאָזע פֿון די RSV אימוניזאַציע במשך 1 וואָך נאָך געבוירט. מערסט זייגקינדער וועלכע מוטערס האָבן באַקומט די RSV וואַקצין דאַרפֿן ניט אויך באַקומען Nirsevimab. ביידע באַשיצן זייגקינדער פֿון שווער RSV ביי צושטעלן אַנטיקערפּער, פֿון די מוטער צום זייגקין אָדער דירעקט צום זייגקין. מערסט זייגקינדער וועלן מסתמא בלויז דאַרפֿן באַשיצונג פֿון דעם מוטערלעך RSV וואַקצין אָדער פֿון Nirsevimab (ניט ביידע). אָבער עז מעגן דאָ זיין עטלעכע סיטואַציעס אין וועלכע מען וואָלט רעקאָמענדירט Nirsevimab פֿאַר אַ זייגקין נאָך די מוטער האָט באַקומען אַ RSV וואַקצין.

זייגקינדער געבוירן געוואָרן אויסער דעם RSV צייט וואָס זינען יונגער ווי 8 מאָנאַטן אַלט דאַרפֿן באַקומען אַן איינציקע RSV אימוניזאַציע דאָזע איידער זייער ערשטן RSV צייט (געוויינלעך אין האַרבסט), אָבער זייגקינדער וואָס זינען יונגער ווי 8 מאָנאַטן אַלט וואָס האָבן ניט באַקומען אַ דאָזע מעגן באַקומען אַ דאָזע במשך דעם צייט.

עטלעכע זייגקינדער און יונגע קינדער וואָס זינען אין אַ הויך ריזק פֿאַר שווער RSV קראַנקייט מעגן דאַרפֿן אַן איינציקע דאָזע פֿון דעם RSV אַנטיקערפּער איידער אָדער במשך זייער צווייטן RSV צייט.

מען קען געבן RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער אין זעלבן צייט אַז רוטיין וואַקצינען רעקאָמענדירט פֿאַר זייגקינדער און יונגע קינדער.

רעדט מיט אייער געזונטערהייט אָפּהיטונג צושטעלער

זאָג אייער געזונטערהייט אָפּהיטונג צושטעלער אויב דעם מענטש וואָס באַקומט דעם פרעווענטיווע אַנטיקערפּער האָט:
• אַ געשיכטע פֿון ערנסט אַלערדזשיק אָפּרופֿן צו אַ RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער (Nirsevimab) אַדער קיין אייער פֿון זיינע קאַמפּאַנענט,
• גיין בלוט אומסדר, אַדער
• מעסיק אַדער שווער אַקוטע קראַנקייט.

אין עטלעכע פֿאַלן, אייער געזונטערהייט אָפּהיטונג צושטעלער מעג באַשלוסן צו אַפּשטופֿן RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער ביז אַ צוקונפֿטיקע וויזט.

מענטשן מיט אַ מינערווערטיק קראַנקייט אַזוי ווי פֿאַרקילונג, מעגן באַקומען אַ RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער מיט זיכערקייט. מענטשן וואָס זיינען מיטלמעסיק אַדער ערנסט קראַנק דאַרפֿן געוויינטלעך וואַרטן ביז זיי קומען אויף זיך.

אייער געזונטערהייט אָפּהיטונג צושטעלער קען אייך געבן מער אינפֿאַרמאַציע.

ריסיקן פֿון אַ רעאַקציע צו RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער

נאָך באַקומען אַ RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער, אייער קינד מעג האָבן דערווייליק ווייטיק, רעדנאַס אַדער געשווילעכץ אווּו מען האָט געשטעלט די איינשפּריצונג, אַדער אַן אויסבראַך.

אַזוי ווי מיט קיין מעדיצין, עס איז דאָ זייער אַ ווייט געלעגנהייט אַז RSV אימוניזאַציע זאָל פֿאַרשאַפֿן אַן ערנסט אַלערדזשיק רעאַקציע, אַן אַנדערן ערנסט הפֿסד אַדער טויטפֿאַל.

אַן אַלערדזשיק אָפּרוף קען געשען נאָך אייער קינד גייט אַרויס פֿון שפּיטאַל אַדער קליניק. אויב איר זעט סימנים פֿון אַן ערנסט אַלערדזשיק רעאַקציע (צום ביישפּיל כּייז, געשווילעכץ פֿון פנים און גאַרגל, שוועריקייט צו אַטעמען, אַ גיך האַרץ קלאַפעניש, איר זייט שווינדלדיק אַדער שוואַך), אַנקלינגט 1-9 און נעמט אייער קינד צו דעם נאָענטסטן שפּיטאַל.

אַנקלינגט אייער געזונטערהייט אָפּהיטונג צושטעלער אויב איר זעט קיין אַנדערע סימפּטאָמס וואָס דערוועגן אייך.

ווי אַזוי קען איך לערנען מער?

- פֿרעגט אייער געזונטערהייט אָפּהיטונג צושטעלער.
- אַנקלינגט אייער אַרטיק אַדער שטאַט געזונטערהייט דעפֿאַרטמענט.
- וויזט דעם וועבפּלאַץ פֿון די שפּייז און דרוג פֿאַרוואַלטונג (Food and Drug Administration, FDA) אויף FDA:Drugs@FDA - באַוויליקט דרוגס.
- קאַנטאַקטירט די צענטערס פֿאַר קראַנקייט קאַנטראָל און פֿאַרמיידונג (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
 - אַנקלינגט 1-800-232-4636
 - אַדער (1-800-CDC-INFO)
 - וויזט דעם [וועבפּלאַץ](https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html) <https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html>

וואָס אויב עס איז דאָ אַן ערנסט פֿראַבלעם?

אויב אייער קינד האָט באַקומען אַ RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער אַן אַ וואַקצין אין דעם זעלבן צייט, און איר חשוד אַ קעגנערש אָפּרוף, איר אַדער אייער געזונטערהייט אָפּהיטונג צושטעלער קען פֿאַרלייגן אַ באַריכט דורך <https://www.fda.gov/medwatch> אַדער ביי טעלעפֿאָן אויף 1-800-FDA-1088.

אויב אייער קינד האָט באַקומט אַ RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער און אַ וואַקצין אין זעלבן צייט און איר חשוד אַ קעגנערש אָפּרוף, איר אַדער אייער געזונטערהייט אָפּהיטונג צושטעלער דאַרפֿן עס באַריכטן צו דעם [וואַקצין קעגנערש געשעעניש באַריכטן סיסטעם \(VAERS\) \(Vaccine Adverse Event Reporting System\)](https://www.vaers.hhs.gov/) <https://vaers.hhs.gov/> אַדער [אַנקלינגט 1-800-822-7967](https://vaers.hhs.gov/). אין אייער באַריכט, באַמערקט אַז אייער קינד האָט באַקומט אַ RSV אימוניזאַציע צוזאַמען מיט אַ וואַקצין.

באַמערקונג: MedWatch און VAERS זיינען בלויז פֿאַר באַריכטן אָפּרופֿן. MedWatch און VAERS פּערסאָנאַל מיטגלידער געבן ניט קיין מעדיקאַל עצות.

