

וואקסין אינפארמאציע סטייטמענט

Many Vaccine Information Statements are available in Yiddish and other languages. See www.immunize.org/vis

פיל וואקסין אינפארמאציע סטייטמענטס זענען אוועלעבל אין אידיש און אנדערע שפראכן. www.immunize.org/vis UVI

רעיביס וואקסין: וואס איר דארפט וויסן

1. פארוואס צו וואקסינירט ווערן?

דער רעיביס וואקסין קען פארמיידן רעיביס.

רעיביס איז אן ערנסטע קראנקייט וואס רעזולטירט כמעט אייביג אין טויט רח"ל.

דער רעיביס ווירוס אינפעקטירט די נערוון סיסטעם. סימפטאמען קענען אנקומען פון עטליכע טעג ביז יארן נאכן זיין אויסגעשטעלט צו דעם ווירוס, און זיי רעכענען אריין זיין צומישט, אבנארמאלע אויפפירונג, זעהן און הערן זאכן וואס זענען נישט עכט, מורא האבן פון וואסער (היידראָפּאָביע) און שוועריקייטן צו שלאפן — נאכגעפאלגט דורך א קאומע און טויט רח"ל.

מענטשן קענען באקומען רעיביס אויב זיי קומען אין בארירונג מיט די שפייעכץ אדער נערוון פלייש פון אן אנגעשטעקטע חיה, צום ביישפיל דורך א ביס אדער א קראץ — אויב זיי באקומען נישט די נויטיגע מעדיצינישע קעיר וואס רעכנט אריין דער רעיביס וואקסין.

2. רעיביס וואקסין

עס איז רעקאמענדירט פאר געוויסע מענטשן וואס האבן גרעסערע אויסזיכטן צו אויסגעשטעלט ווערן צו רעיביס, צום ביישפיל אזעלכע וועלכע ארבעטן מיט חיות וועלכע קענען פאטענציאל זיין אנגעשטעקט, צו באקומען דעם וואקסין צו העלפן פארמיידן רעיביס אויב זיי ווערן אויסגעשטעלט דערצו. אויב איר האט גרעסערע אויסזיכטן צו אויסגעשטעלט ווערן צו דעם רעיביס ווירוס:

- זאלט איר באקומען 2 דאזעס פון דעם רעיביס וואקסין, געגעבן אויף טאג 0 און אויף די 7'טע טאג.
- געוואנדן אין ווי גרויס אייער סכנה איז, וועט איר מעגליך גע'עצה'ט ווערן צו מאכן איין אדער מער בלוט טעסטס אדער צו באקומען א בוסטער דאזע אין די 3 יאר נאך די ערשטע 2 דאזעס. אייער דאקטאר קען אייך גיבן מער איינצלהייטן.



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

דער רעיביס וואקסין קען פארמיידן רעיביס אויב עס ווערט געגעבן פאר א מענטש נאכן אויסגעשטעלט ווערן. נאכן ווערן זיכער אדער מעגליך אויסגעשטעלט צו רעיביס, זאל דעם פלאץ פון די וואונד גרונטליך גערייניגט ווערן מיט זייף און וואסער. אויב אייער דאקטאר אדער לאקאלע העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז איר זאלט באקומען דעם וואקסין, זאל עס געגעבן ווערן ווי שנעלער נאכן ווערן אויסגעשטעלט, אבער עס וועט קענען ארבעטן אין יעדע צייט פאר די סימפטאמען הויבן זיך אן. איינס די סימפטאמען באווייזן זיך איז דער רעיביס וואקסין מער נישט ווערט צו פארמיידן רעיביס.

• אויב זענט איר נישט וואקסינירט געווארן אין די פארגאנגענהייט קעגן רעיביס, דארפט איר 4 דאזעס פון דעם רעיביס וואקסין איבער א צייט אפשינט פון 2 וואכן (געגעבן אויף די טעג 0, 3, 7 און 14). איר זאלט באקומען נאך א מעדיצין וואס הייסט רעיביס אימונאָגלאָבּיּוּלין (rabies immunoglobulin) אויף די טאג וואס איר באקומט די ערשטע דאזע פון דעם רעיביס וואקסין אדער נישט לאנג דערנאך.

• אויב זענען איר וואקסינירט געווארן קעגן רעיביס אין די פארגאנגענהייט דארפט איר געווענטליך נאך 2 דאזעס פון דעם רעיביס וואקסין נאכן אויסגעשטעלט ווערן.

דער רעיביס וואקסין קען געגעבן ווערן אין דעם זעלבן צייט ווי אנדערע וואקסינען.

3. רעדט מיט אייער דאקטאר

זאגט דעם צושטעלער פון וואקסין אויב דער מענטש וואס באקומט דעם וואקסין:

- האט געהאט אן אלערגישע רעאקציע נאך א פריערדיגע דאזע פונעם רעיביס וואקסין, אדער האט סיי וועלכע ערנסטע, לעבנס-סכנות'דיגע אלערגיעס
- האט אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם
- נעמט אדער פלאנירט צו נעמען קלאָרֶאָקוויין (chloroquine) אדער א מעדיצין אין די משפחה פון קלאָרֶאָקוויין
- האט באקומען דעם רעיביס וואקסין אין די פארגאנגענהייט (אייער דאקטאר וועט דארפן וויסן ווען איר האט באקומען סיי וועלכע רעיביס וואקסין דאזעס אין די פארגאנגענהייט)

5. וואס אויב עס איז דא אן ערנסטן פראבלעם?

אן אלערגישע רעאקציע קען פארקומען נאכדעם וואס דער מענטש וואס האט באקומט דעם וואקסין פארלאזט די קליניק. אויב איר זעט סימנים פון אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע (אויסלאגן, אן אויפגעשוואלענע פנים און האלז, שוועריקייטן צו אטעמען, א שנעלע הארץ קלאפ, א שווינדל אדער שוואכקייט), רופט 1-911 און נעמט דעם מענטש צו דעם נאענסטן שפיטאל.

פאר אנדערע סימנים וואס באזארגן אייך רופט אייער דאקטאר.

אומגעוואונטשענע רעאקציעס זאלן באריכטעט ווערן צו דעם Vaccine Adverse Event Reporting System (וואקסין אומגעוואונטשענע אינצידענטן באריכטונג סיסטעם) (VAERS). אייער דאקטאר וועט געווענטליך זיין דער וואס וועט אריינגעבן דעם באריכט, אדער איר קענט דאס אליין טאן. באזוכט די VAERS וועבזייטל אויף www.vaers.hhs.gov אדער רופט 1-800-822-7967. VAERS איז געווייזענע נאר צו באריכטן רעאקציעס, און VAERS שטאב מיטגלידער גיבן נישט קיינע מעדיצינישע עצות.

6. ווי אזוי קען איך לערנען מער?

- פרעגט אייער דאקטאר.
- רופט אייער לאקאלע אדער סטייט העלט דעפארטמענט.
- באזוכט די וועבזייטל פון די Food and Drug Administration (עסן און דראג אדמיניסטראציע) (FDA) פאר די אינפארמאציע צעטלעך וואס קומען מיט די וואקסין פעקלעך און פאר נאך אינפארמאציע אויף www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.
- פארבינדט זיך מיט די Centers for Disease Control and Prevention (צענטערס פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג) (CDC):
- רופט 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) אדער
- באזוכט די CDC וועבזייטל אויף www.cdc.gov/rabies

אין טייל פעלער, קען אייער דאקטאר מעגליך באשליסן צו אפשטופן א רוטינע (איידער זיין אויסגעשטעלט) רעיביס וואקסיןאציע מיט ביז א צוקונפטדיגע באזוך. אדער קען אייער דאקטאר מאכן א בלוט טעסט פריער אדער נאך די רעיביס וואקסיןען ווערן געגעבן צו באשטימען ווי אימיון איר זענט קעגן רעיביס.

מענטשן וואס פילן זיך מילד נישט גוט, ווי צום ביישפיל א פארקילעכץ, קענען וואקסיןירט ווערן. מענטשן וואס זענען מיטלמעסיג אדער ערנסט קראנק זאלן געווענטליך ווארטן ביז זיי דערהוילן זיך איידער באקומען א רוטינע (איידער זיין אויסגעשטעלט) דאזע פון דעם רעיביס וואקסין. **אויב זענט איר אויסגעשטעלט געווארן צו דעם רעיביס ווירוס, זאלט איר וואקסיןירט ווערן אפגעזעהן פון אויב אין דעם צייט האט איר אנדערע קראנקייטן, זענט טראגעדיג, נירסט א בייבי, אדער האט אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם.**

אייער דאקטאר קען אייך גיבן מער אינפארמאציע.

4. סכנות פון א רעאקציע צום וואקסין

- ווייטאג, רויטליכקייט, א געשווילעכץ אדער קראצן ביי דעם פלאץ וואו מען האט געגעבן די איינשפריץ און א קאפוויי, איבל, בויך ווייטאג, ווייטאגן אין די מוסקלען אדער א שווינדל קענען געשען נאכן באקומען דעם רעיביס וואקסין.
- אויסשלאגן (היווס), ווייטאג אין די דזשווינטס (געלענקן) אדער פיבער געשען צומאל נאך בוסטער דאזעס.

מענטשן חלש'ן צומאל נאך מעדיצינישע פראצעדורן, אריינרעכענענדיג וואקסיןאציע. זאגט אייער דאקטאר אויב איר באקומט א שווינדל אדער אויב אייער זעענונג טוישט זיך אדער אויב איר הערט קלינגען אין די אויערן.

פונקט ווי מיט סיי וועלכע מעדיצין, עס זענען דא גאר קליינע אויסזיכטן אז א וואקסין זאל פאראורזאכן א שווערע אלערגישע רעאקציע, אן אנדערע ערנסטע שעדיגונג, אדער טויט.

